

Vaccin antipneumococcique conjugué (Pneu-C-13)

Santé publique — Fiche d'information

L'immunisation a sauvé plus de vies que toute autre intervention médicale au cours des 50 dernières années au Canada¹. Les vaccins aident le système immunitaire à reconnaître et à combattre les bactéries et les virus qui causent des maladies.

Qu'est-ce qu'une pneumococcie?

Une infection pneumococcique est causée par une bactérie qui se transmet facilement d'une personne à une autre. La bactérie est normalement présente dans les fluides du nez, de la bouche et de la gorge. Elle se propage par la toux, les éternuements ou le partage d'aliments ou de boissons. La plupart des personnes porteuses de la bactérie ne tombent pas malades, mais elles peuvent quand même la transmettre à d'autres personnes.

Une infection pneumococcique peut causer des maladies graves et parfois mortelles, y compris une infection des poumons (pneumonie), du sang (bactériémie) et de l'enveloppe du cerveau (méningite). Les méningites peuvent avoir des conséquences permanentes, comme la surdité et des dommages au cerveau. La période d'incubation peut être très courte (de 1 à 3 jours).

Les bébés et les jeunes enfants de moins de cinq ans courent davantage de risques de tomber malades. Les enfants peuvent attraper l'infection en utilisant des sucres, des biberons ou des jouets que d'autres enfants ont mis dans leur bouche.

Qu'est-ce que le vaccin Pneu-C-13?

Le vaccin antipneumococcique conjugué Pneu-C-13 a été approuvé par Santé Canada. Il y a plus de 90 types de souches de pneumocoques qui circulent. Ce vaccin offre une protection contre 13 d'entre elles, soit celles qui sont responsables des plus graves infections. Le vaccin est administré à l'aide d'une seringue.

Pour une protection complète contre les infections pneumococciques, plusieurs doses pourraient être requises pendant une certaine période. Il est important de suivre le calendrier de vaccination du Manitoba.

Pourquoi devrais-je recevoir le vaccin Pneu-C-13?

L'immunisation est le meilleur moyen de vous protéger, vous et vos enfants, contre une infection pneumococcique qui est souvent grave et parfois mortelle.

Les vaccins permettent de préparer votre système immunitaire pour que votre corps soit prêt à combattre une exposition éventuelle future à la bactérie.

Le vaccin contribue à votre protection ainsi qu'à celle de votre famille et de votre collectivité.

Effets secondaires possibles du vaccin Pneu-C-13

Il est beaucoup plus sûr de recevoir le vaccin que d'attraper une infection pneumococcique, avec les risques de complications qui y sont liés. Santé Canada approuve les vaccins après un examen de leur qualité et de leur sécurité.

Les réactions courantes au vaccin peuvent inclure de la douleur, une gêne, des rougeurs ou une enflure à l'endroit où le vaccin a été injecté. Les autres symptômes possibles sont de la fièvre, de l'irritabilité, un manque d'appétit et de la fatigue. Il s'agit de réactions bénignes qui durent généralement entre un à deux jours. De l'acétaminophène (p. ex. TylenolMD) peut être administré pour soulager la fièvre et la douleur.

Il ne faut JAMAIS donner de l'AAS (Aspirine^{MD}) à un enfant, car cela peut causer le syndrome de Reye, une grave maladie du foie et du cerveau.

Il est important de rester 15 minutes à la clinique après avoir reçu un vaccin, car il y a un faible risque de réaction allergique grave. Cette réaction peut comprendre de l'urticaire, des difficultés respiratoires ou une enflure de la gorge, de la langue ou des lèvres. Composez le 911 ou présentez-vous au service

¹ Agence de la santé publique du Canada

Vaccin antipneumococcique conjugué (Pneu-C-13)

d'urgence le plus proche pour obtenir une aide immédiate si une réaction se produit après votre départ de la clinique.

Signalez tout effet secondaire grave ou inattendu à un fournisseur de soins de santé.

Qui devrait recevoir le vaccin Pneu-C-13?

Tous les bébés et enfants de moins de 5 ans (jusqu'à 59 mois) devraient recevoir toutes les doses requises du vaccin Pneu-C-13 dans le cadre du calendrier de vaccination systématique des enfants du Manitoba. Il est particulièrement important d'administrer le vaccin Pneu-C-13 aux enfants s'ils sont d'ascendance autochtone ou s'ils ont un ou plusieurs des troubles médicaux ou états de santé suivants :

- une fuite de liquide céphalorachidien;
- une rate absente ou dysfonctionnelle;
- une drépanocytose;
- un système immunitaire affaibli par une maladie ou un traitement médical (y compris une stéroïdothérapie à doses élevées de longue durée);
- une maladie des reins, du cœur, du foie ou des poumons;
- le diabète;
- une greffe d'un organe plein ou de cellules souches;
- le port d'un implant cochléaire ou en attente d'un tel implant;
- le VIH;
- un trouble neurologique chronique gênant l'évacuation des sécrétions buccales;
- le cancer, y compris une leucémie ou un lymphome.

Certaines personnes ont un état de santé qui entraîne un risque plus élevé d'attraper une infection pneumococcique. Les personnes qui sont âgées de plus de 5 ans (60 mois) devraient recevoir le vaccin Pneu-C-13 dans les cas suivants :

- elles ont reçu une greffe d'organe plein;
- elles sont porteuses du virus de l'immunodéficience humaine (VIH);
- elles ont subi une greffe de cellules souches hématopoïétiques.

Les personnes de plus de deux ans à risque élevé en raison de leur état de santé pourraient avoir besoin d'une autre sorte de vaccin antipneumococcique, à savoir le vaccin polysaccharidique antipneumococcique (Pneu-P-23). Pour tout autre renseignement, veuillez consulter la fiche d'information intitulée **Vaccin antipneumococcique polysaccharidique (Pneu-P-23)**.

Demandez à votre vaccinateur ou à votre vaccinatrice si vous, ou vos enfants, pouvez recevoir gratuitement le vaccin Pneu-C-13 dans le cadre du programme d'immunisation du Manitoba.

Qui NE devrait PAS recevoir le vaccin Pneu-C-13?

Parlez à votre fournisseur de soins de santé si :

- vos enfants ou vous-même avez eu une réaction allergique grave au vaccin après avoir reçu une dose précédente de ce vaccin, ou vous avez une allergie grave à l'un des composants du vaccin ou de son contenant;

Toute personne qui a une forte fièvre ne devrait pas être immunisée. Par contre, si elle n'est que légèrement malade, par exemple si elle est enrhumée, elle peut recevoir le vaccin.

Votre dossier de protection

Veillez à ce que votre vaccinateur mette à jour votre fiche d'immunisation ou celle de vos enfants après avoir administré le vaccin. Gardez la fiche en lieu sûr.

Vos immunisations ou celles de vos enfants seront inscrites dans le registre d'immunisation du Manitoba. Ce registre :

- permet au fournisseur de soins de santé de savoir quels vaccins votre enfant ou vous-même avez reçus ou avez besoin de recevoir;
- peut servir à produire des fiches d'immunisation, ainsi qu'à vous avertir ou à avertir votre fournisseur de soins de santé si vous avez manqué une immunisation;
- permet au ministère de la Santé, des Aînés et de la Vie active et aux responsables de la santé publique de surveiller l'efficacité des vaccins pour prévenir des maladies.

Vaccin antipneumococcique conjugué (Pneu-C-13)

Si vous avez besoin de renseignements sur les immunisations que vous ou votre enfant avez reçues, veuillez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé.

La Loi sur les renseignements médicaux personnels protège vos renseignements et ceux de vos enfants. Vous pouvez demander à ce que vos renseignements médicaux personnels et ceux de vos enfants ne soient pas visibles pour les fournisseurs de soins de santé. Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à votre bureau de la santé publique local afin de discuter avec une infirmière de la santé publique.

Pour obtenir une liste des bureaux de la santé publique, consultez la page suivante :

www.gov.mb.ca/health/publichealth/offices.fr.html.

Pour en savoir plus sur le vaccin Pneu-C-13 :

- Parlez à votre médecin, à un pharmacien ou à une infirmière de la santé publique.
- Téléphonnez à Health Links – Info Santé au 204 788-8200 à Winnipeg ou au 1 888 315-9257 sans frais ailleurs au Manitoba;
- ou consultez le site Web suivant :

Programme d'immunisation du Manitoba :

www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/div/index.fr.html

Site Web du gouvernement du Canada

canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/immunization-immunisation/index-fra.php

Site Web de la Société canadienne de pédiatrie

www.cps.ca/fr/