

Vaccin antiméningococcique conjugué quadrivalent (Men-C-ACYW)

Santé publique – Fiche d'information

À titre de l'une des plus importantes réalisations dans le domaine de la santé publique, l'immunisation permet de circonscrire et d'éliminer la propagation des infections et des maladies. Les vaccins aident le système immunitaire à reconnaître et à combattre les bactéries et les virus qui causent des maladies.

Que sont les méningococcies?

Les bactéries méningococciques peuvent causer une méningite (infection du cerveau) et une septicémie (infection du sang), de façon concomitante ou non. La plupart des cas sont attribuables aux souches A, B, C, Y et W.

Les bactéries se propagent d'une personne infectée à une autre par la toux, les éternuements, les baisers ou le partage de nourriture ou d'autres objets.

Les signes et symptômes des méningococcies, qui apparaissent entre deux et dix jours après l'infection, peuvent inclure une fièvre élevée, une éruption cutanée, des maux de tête intenses et une raideur au cou.

Même lorsqu'elles sont traitées rapidement, les méningococcies peuvent être graves, voire mortelles. Environ 10 % des personnes atteintes décèdent de l'infection, et entre 10 et 20 % des survivants souffriront de dommages cérébraux permanents ou de surdit , ou ils devront se faire amputer.

On recommande de pr venir la maladie par la vaccination.

Qu'est-ce que le vaccin Men-C-ACYW?

Administr  par injection et approuv  par Sant  Canada, le vaccin antim ningococcique conjugu  quadrivalent (Men-C-ACYW) offre une protection contre les m ningococcies caus es par les souches A, C, Y et W.

Pourquoi devrais-je recevoir le vaccin Men-C-ACYW?

Tr s efficace pour pr venir les m ningococcies et leurs complications graves, le vaccin pr pare votre syst me immunitaire   combattre les bact ries

m ningococciques. Il est important que vos enfants et vous-m me receviez toutes les doses indiqu es dans le calendrier des vaccinations recommand es du Manitoba.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin Men-C-ACYW?

Sant  Canada approuve les vaccins apr s un examen de leur qualit  et de leur s curit . Il est beaucoup plus s r de recevoir le vaccin que de contracter une m ningococcie.

Les r actions courantes au vaccin incluent de la douleur, des rougeurs ou de l'enflure   l'endroit o  le vaccin a  t  inject . Les autres sympt mes comprennent la fi vre, des maux de t te et une sensation g n rale de malaise. Il s'agit de r actions b nignes qui durent g n ralement un ou deux jours. Il est possible d'administrer de l'ac taminoph ne (p. ex., Tylenol®) pour soulager la fi vre ou la douleur.

Il ne faut JAMAIS donner de l'acide ac tylsalicylique (p. ex., Aspirin®) aux enfants, car ce m dicament peut causer une grave maladie du foie et du cerveau appel e syndrome de Reye.

Une r action allergique grave est un effet secondaire grave mais rare d coulant de l'administration du vaccin, comme de l'urticaire, de la difficult    respirer ou une enflure de la gorge et du visage. Il est important de rester 15 minutes en observation   la clinique apr s avoir re u un vaccin. Composez le 911 ou pr sentez-vous au service d'urgence le plus proche pour obtenir une aide imm diate si une r action se produit apr s votre d part de la clinique.

Signalez tout effet secondaire grave ou inattendu   un fournisseur de soins de sant .

Vaccin antiméningococcique conjugué quadrivalent (Men-C-ACYW)

Qui devrait recevoir le vaccin Men-C-ACYW?

Moins de dix ans

- Les enfants âgés d'au moins 12 mois nés le 1^{er} janvier 2020 ou après cette date peuvent recevoir une dose du vaccin Men-C-ACYW, qu'ils aient déjà reçu ou non le vaccin antiméningococcique conjugué contre les méningococcies du groupe C (Men-C-C). En cas d'immunisation antérieure au moyen du vaccin Men-C-C, il est recommandé d'attendre au moins quatre semaines avant de faire administrer le vaccin Men-C-ACYW.
- Les enfants et adolescents nés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2019 peuvent recevoir une dose s'ils n'ont jamais reçu le vaccin Men-C-C dans le cadre du programme pour les enfants de 12 mois et plus ET qu'ils sont âgés de plus de 10 ans.

Dix ans et plus

Une dose est offerte systématiquement à tous les élèves de 6e année dans le cadre du Programme d'immunisation scolaire du Manitoba.

- Les enfants et adolescents âgés d'au moins 10 ans qui sont nés le 1er janvier 2008 ou après cette date peuvent recevoir une dose qui est offerte systématiquement à tous les élèves de 6e année, qu'ils aient déjà reçu ou non le vaccin antiméningococcique (Men-C-C ou Men-C-ACYW).
- Les adolescents et jeunes adultes nés entre 1995 et 2007 peuvent recevoir une dose s'ils n'ont jamais reçu le vaccin Men-C-C.

Si votre enfant n'a pas reçu le vaccin en milieu scolaire, il pourra l'obtenir auprès d'un autre fournisseur de services de vaccination.

Les personnes qui sont atteintes de problèmes médicaux les exposant à un risque plus élevé de contracter une méningococcie peuvent également recevoir le vaccin Men-C-ACYW sans frais. Ces personnes pourraient avoir besoin de plus d'une dose pour obtenir une protection maximale.

Il s'agit notamment des personnes répondant aux critères suivants :

- personnes qui n'ont pas de rate ou qui présentent une dysfonction de la rate;

- personnes qui ont un déficit en complément, en properdine, en facteur D ou en anticorps primaires;
- présenter un déficit acquis en complément
- personnes qui présentent certains facteurs de risque génétiques (p. ex., polymorphismes dans les gènes de lectine liant le mannose et du facteur de nécrose tumorale);
- personnes infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH);
- les personnes ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques
- les personnes ayant suivi une thérapie CAR-T
- receveurs d'une transplantation d'organe plein;
- patients recevant les soins d'un hématalogue ou d'un oncologue d'Action cancer Manitoba.

Adressez-vous à votre fournisseur de soins de santé pour savoir si vous pouvez recevoir gratuitement le vaccin Men-C-ACYW dans le cadre du calendrier des vaccinations recommandées, de même que pour déterminer le nombre de doses dont vous aurez besoin pour obtenir la protection voulue.

Pour connaître les plus récents critères d'admissibilité au vaccin, consultez le: manitoba.ca/health/publichealth/cdc/vaccineeligibility.fr.html.

Qui ne devrait pas recevoir le vaccin Men-C-ACYW?

Parlez à votre fournisseur de soins de santé si vos enfants ou vous-même êtes dans l'une des situations suivantes :

- vous avez eu une réaction allergique grave après avoir reçu une dose précédente du vaccin ou avez une allergie à l'un de ses ingrédients.

Les personnes ayant une forte fièvre devraient reporter la vaccination. Le vaccin peut toutefois être administré en cas de maladie bénigne (p. ex., rhume).

Votre dossier de protection

Tous les vaccins que vous recevez sont inscrits sur votre fiche d'immunisation dans le registre d'immunisation du Manitoba.

Vaccin antiméningococcique conjugué quadrivalent (Men-C-ACYW)

Ce registre :

- permet au fournisseur de soins de santé de savoir quels vaccins votre enfant ou vous-même avez reçus ou avez besoin de recevoir;
- permet de produire les fiches d'immunisation ou les avis d'immunisation vous indiquant que des vaccins sont en retard;
- permet aux responsables de la santé publique d'évaluer l'efficacité de différents vaccins pour prévenir des maladies.

Pour savoir comment obtenir une copie de votre dossier d'immunisation, consultez le : www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/div/records.fr.html.

La Loi sur les renseignements médicaux personnels protège vos renseignements et ceux de vos enfants. Vous pouvez demander que vos renseignements médicaux personnels et ceux de vos enfants ne soient pas visibles par les fournisseurs de soins de santé. Pour en savoir plus : www.gov.mb.ca/health/publichealth/surveillance/phims.fr.html.

Consultez la version la plus récente du présent document ou d'autres fiches d'information et ressources sur les vaccins à l'adresse : www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/div/index.fr.html.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méningococcie ou le vaccin Men-C-ACYW :

- discutez-en avec votre fournisseur de soins de santé;
- téléphonez à Health Links–Info Santé au 204 788-8200 à Winnipeg ou au 1 888 315-9257 sans frais ailleurs au Manitoba;
- consultez le site Web du Programme d'immunisation du Manitoba au : www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/div/index.fr.html.